

Šestá nemoc

Napsal uživatel Administrator

Neděle, 13 Duben 2008 10:45 - Aktualizováno Úterý, 07 Červenec 2009 10:23

Šestá nemoc, latinsky roseola infantum nebo exantema subitum (něco jako "dětská růžovka", "rychlá vyrážka" nebo podobně - česky se vzácně hovoří i o "třídenní horečce") - je virové onemocnění starších kojenců a batolat, přičemž virem je promořeno 90% dospělé populace, nákaza se šíří vzduchem.

PŘÍZNAKY:

příznaky se objevují 5-15 dnů po nakažení

PRVNÍ A ČTVRTÝ DEN:

- Vysoká teplota
- Někdy mírný rýma nebo kašel

ČTVRTÝ AŽ OSMÝ DEN:

- Teplota se náhle vrátí na obvyklou úroveň
- Na hlavě a na trupu se objeví růžová drobně skvrnitá vyrážka trvající několik hodin až 2 dny
- Vyrážka bledne, ostatní příznaky mizí

LÉČBA:

1. Pokud má dítě teplotu 39 °C a vyšší, zavolejte lékaře.
2. Snažte se srážet teplotu, aby dítěti bylo lépe. Na krátkou dobu můžete použít paracetamol (paralen sirup, čípky).
3. Podávejte dítěti hodně tekutin.

Pokud v období horečky nedojde k febrilním křečím, je průběh jinak nekomplikovaný, léčíme pouze příznaky. Hlavním problémem i pro lékaře je odlišení tohoto onemocnění od alergické vyrážky po podání léku na snížení horečky v první fázi onemocnění - tato alergická vyrážka se objevuje později (tak až 6.- 8.den při podávání léku), zatímco tato infekční vyrážka se vysévá opravdu po 2-3 dnech horečky.

www.miminet.cz